

MAVENA

DERMA VİTAMİN B₁₂ LINE

MAVENA DERMA VİTAMİN B₁₂ LINE

Sayın Kullanıcımız,
Lütfen bu kullanım talimatını dikkatle okuyunuz çünkü ürünün kullanımında dikkat etmeniz gereken önemli bilgileri içermektedir. Sorunuz olduğunda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sedef hastalığı ve nörodermatit (egzama) tedavisinde haricen uygulanır

Kullanım talimatı:

**Mavena®B12 AD Akut Gel
TIBBİ CİHAZ**

Bileşimi:

1 gram Akut jel'de 0,7 mg Siyanokobalamin (B₁₂ vitamini) bulunur.

Kullanım alanı:

Mavena®B12 Akut Jel, sedef hastalığı ve nörodermatit tedavisinde haricen kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Mavena®B12 AD Akut Jel ne zaman kullanmamalısınız?

Siyanokobalamin (B₁₂ vitamini) ile ilaçta bulunan diğer içerik maddelerine karşı alerjiniz olduğu takdirde Mavena®B12 AD Akut Jel kullanmamalısınız.

Mavena®B12 AD Akut Jel hangi hallerde doktor kontrolünde kullanabilirsiniz?

Aşağıda, Mavena®B12 AD Akut Jel sadece hangi özel durumlarda ve sadece özel dikkat göstererek kullanabileceğiniz açıklanmaktadır. Lütfen, bu konuda doktorunuza danışınız.

Mavena®B12 AD Akut Jel açık yaralarda ve cildin bakteriyel iltihaplanmalarında sadece özel dikkat göstererek (yani uzun aralıklarla veya daha az miktarlarda) ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Her ne kadar ortaya çıkan cilt tahrişleri Mavena®B12 AD Akut Jel kullanılmasına devam edildiğinde iyileşmekte ise de tedavinin kesilmesi önerilir, çünkü nadir durumlarda bunun nedeni Mavena®B12 AD Akut Jel bulunan etken maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerji olabilir.

Gebelik ve emzirme durumlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Mavena®B12 AD Akut Jel'in etken maddesi, doğada bulunan bir vitamindir. Yapılan klinik araştırmalar sonucunda, Mavena®B12 AD Akut Jel'in kullanımının kandaki B₁₂ miktarını arttırmadığı tespit edilmiştir. Yine de bu preparatı gebelik esnasında ve emzirme döneminde doktorunuzun onayını alarak kullanınız çünkü bu konuda yeterince deneyim mevcut değildir. Emzirme döneminde merhem kullanımı gerekli ise, merhemi göğüs bölgesine sürmeyiniz. Ayrıca bebeğin, vücudunuzdaki merhem sürmüş olduğunuz bölgeler ile temasını engelleyiniz.

Çocuklarda ve yaşlılarda nelere dikkat etmek gerekir?

4 haftalık bebeklerde, çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde kullanılır.

Hangi önlemler dikkate alınmalıdır?

Eğer Mavena®B12 AD Akut Jel'in içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olup olmadığına emin değilseniz, AD Akut jel'i ilk kullandığınızda, tercihen koltukaltının iç kısmına, küçük bir bölgeye sürerek alerjik reaksiyon olup olmayacağını kontrol etmenizi öneririz. Ürünü çocukların erişmeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Dikkat edilmesi gereken diğer konular nelerdir?

Mavena®B12 AD Akut Jel göz bölgesine sürmeyiniz. Mavena®B12 AD Akut Jel pembe renginin nedeni etken maddesidir. Söz konusu vitamin suda çözüldüğünden, elbiselerin boyanması mümkündür ancak bu lekeler normal olarak çamaşır makinesinde 30° C` de yıkama ile tamamen çıkar. Yine de AD Akut Jeli cildinize sürdükten sonra, elbisenizi giymeden evvel emilmesini bekleyiniz.

Diğer maddeler ile etkileşimi

Diğer maddelerle olan herhangi bir etkileşimi bilinmemektedir.

Mavena®B12 AD Akut Jel hangi miktarda ve ne kadar süre ile kullanılmalıdır?

Mavena®B12 AD Akut Jel günde bir veya iki kere, vücudun hasta bölgelerine her bir cm²'ye 2 mg olmak üzere ince bir tabaka olarak sürülmelidir ve hafif masajla yedirilmelidir; bu miktar yaklaşık bir pirinç tanesi kadardır. Gebelik ve emzirme durumlarında Mavena®B12 AD Akut Jel kullanılması için doktora başvurmak gerekmektedir.

Mavena®B12 AD Akut Jel ne kadar süre ile kullanılmalıdır?

Mavena®B12 AD Akut Jel ile tedavi, gerekli olduğu sürece yapılmalıdır. Şimdiye kadar yapılan deneyimlerde, süre olarak sedef hastalığının tedavisinde en fazla 16 hafta ve nörodermatit hastalığının tedavisinde en fazla 12 hafta saptanmıştır. Ancak etken maddesinin bilinen özelliğine bağlı olarak, tedavi süresinin herhangi bir özel önleme gerek olmaksızın daha uzun sürmesi mümkündür.

Yan etkiler

Mavena®B12 AD Akut Jel kullanılması esnasında hangi yan etkiler ortaya çıkabilir ve gerektiğinde hangi tedbirler alınmalıdır?

Mavena®B12 AD Akut Jel ile tedavi esnasında bazen ciltte tahrişler (kızarma, kaşınma) görülebilir. Bunlar geçicidir ve nedenleri mutlaka Mavena®B12 AD Akut Jel kullanılıyor olması değildir. Her ne kadar ciltteki tahrişler Mavena®B12 AD Akut Jel kullanılmasına devam edildiğinde iyileşmekte ise de tedavinin kesilmesi önerilir, çünkü nadir durumlarda bunun nedeni Mavena®B12 AD Akut Jel bulunan etken maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerji olabilir. Şikâyetler önemli ise veya devam ediyorsa, doktora başvurunuz.

Eğer bu kullanım talimatında belirtilenlerin dışında bir yan etki tespit ederseniz, lütfen bu durumu doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Ürünün son kullanma tarihine ilişkin bilgiler



Ürün, tüpün üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır ve tüpün açılmasından sonra 6 ay içinde tüketilmelidir.



Ürünün parti numarası ve son kullanma tarihi için tüpün katlanmış kısmına bakınız.



Ürünü 5° C'nin altında ve 25° C'nin üstünde muhafaza etmeyiniz.



Üretici Firma

Mavena Health Care Italia S.r.l. Via Caradosso 18
20123 Milano

Türkiye Distribütör

İstanbul Eurasya Tic. Ltd. Şti. 34760 İstanbul

info@mavena.com.tr

Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Güncelleme tarihi: Aralık 2013

